



¿QUÉ HACER EN CASO DE PICADURA?

Hay que tener en cuenta que el veneno de abeja contiene feromonas, que atraen a otras abejas, por lo que no es raro que tras una picadura se produzcan otras si no se abandona el lugar en que se ha producido.

En el caso de ser atacado por abejas:

☐ Conserve la calma. Piense ordenadamente los pasos que han de seguirse y actúe a continuación.

☐ Si el insecto ha dejado un aguijón, nunca presione el saco. Despéguelo con una uña desde dentro hacia fuera.

☐ Acuda los servicios médicos más cercano .

☐ Si la picadura se ha producido en brazos o piernas, haga un torniquete por encima y aflójelo cada 10 minutos.

Con esto ya ha hecho lo más importante. Ahora debe acudir a un Centro Médico sin perder tiempo pero sin precipitación. No olvide pedir que conduzca otra persona.

REACCIONES GRAVES POR PICADURAS

Es una enfermedad progresiva en la que cada picadura produce una reacción más violenta que la anterior.

Pero se trata de una enfermedad curable, se dispone de tratamientos altamente eficaces, que proporcionan protección al paciente que los reciben hasta 90 % de los casos.



TELEFONOS DE EMERGENCIA Y APOYO

Protección Civil
4 40 70 31 Y 4 40 70 32
Bomberos Central
4 84 41 22/4 84 41 23
Bomberos Renacimiento
4 41 62 23
Bomberos Mercado Central
4 80 13 89
Bomberos Pie de la Cuesta
4 60 21 12
Bomberos Coloso
4 68 60 66
Bomberos Diamante
4 62 04 54
Dirección General de Salud Municipal
4 40 70 43/4 40 70 12
Hospital General
4 85 58 80
Hospital Donato G. Alarcón
4 42 90 50
Emergencias
066

H. Ayuntamiento de Acapulco
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil
Dirección de Protección Civil y Bomberos
C. Hornitos No. 7 Ex zona Militar
Colonia Centro

Mayores Informes o sugerencias
<http://www.acapulco.gob.mx/proteccioncivil/>
pc.acapulco@hotmail.com



Que hacer en caso de ataque de abejas africanizadas



La Protección Civil es Responsabilidad de Todos

Seguimos Trabajando



Características

Es un híbrido mezcla europea y Africana, físicamente es similar en tamaño y color a la abeja Europea, se diferencia solo en laboratorio.

Todas las Abejas y Avispas inyectan un veneno defensivo mediante un aguijón. Pertenecen al grupo zoológico de los himenópteros, su picadura en la inmensa mayoría de las personas produce una roncha de pocos centímetros de diámetro, dolorosa, que desaparece en unas horas sin dejar rastro.

Una minoría de la población está predispuesta a padecer reacciones importantes a la picadura de abeja, su veneno no es de gran toxicidad para los humanos; salvo en personas alérgicas. En estos casos, el sujeto responde con una reacción exagerada a una simple picadura.



La reacción es muy variable. Puede ir desde una reacción local muy llamativa (por ejemplo, hinchazón de todo el brazo, hasta el hombro, tras una picadura en la mano), hasta una reacción generalizada, que afecte a varios órganos al mismo tiempo. Lo más común es la reacción en la piel (urticaria generalizada), pero también pueden aparecer reacciones en las mucosas conjuntival y

Qué hacer en caso de ataque de abejas africanizadas

(asma), en el tubo digestivo (vómito, dolor abdominal) e incluso en órganos vitales como el cerebro o el aparato cardiocirculatorio. En casos extremos las reacciones pueden ser una amenaza para la vida.

¿CÓMO EVITAR LAS PICADURAS DE ABEJAS?

- ☐ No se acerque a panales ni avisperos, si accidentalmente se acerca, retírese con movimientos lentos.
- ☐ En la proximidad de colmenas o enjambres, permanezca en la sombra.
- ☐ En caso de ataque o aproximación de una colonia de abejas, tírese al suelo y permanezca inmóvil hasta que se hayan alejado.
- ☐ Si una Abeja o Avispa se posa sobre alguna parte de su cuerpo o sus ropas, no intente matarla ni espantarla. Permanezca quieto o haga sólo movimientos lentos hasta que se aleje.
- ☐ Si bebe algún líquido azucarado, compruebe que no hay ningún insecto en el borde del vaso o la superficie de la bebida.
- ☐ Si deja su ropa en el suelo, sacúdala antes de ponérsela.
- ☐ En espacios al aire libre, evite caminar descalzo.
- ☐ Entre mayo y septiembre, procure evitar las ropas de colores oscuros, los adornos brillantes y los perfumes y productos de cosmética que pueden atraer a los insectos (brillantinas, spray para el pelo, cremas etc).
- ☐ Evite los trabajos de jardinería.
- ☐ No podes plantas ni riegue césped.

☐ Las colisiones con himenópteros pueden producir picaduras.

☐ Evite correr, montar a caballo, bicicleta, moto o coche descubierto en zonas del campo y jardines

☐ Coloque mallas, persianas o mosquiteras en las ventanas de su casa en verano.

☐ Tenga a mano un spray insecticida (en la guantera del coche puede ser de utilidad).

☐ Evite que los niños tiren piedras a los árboles o nidos de abejas.

☐ No se acerque o manipule alimentos al aire libre.

☐ No se acerque a los cubos de basura en la calle.

Tenga en cuenta que las abejas y avispas sólo pican en su propia defensa o la del nido. La mayoría de las picaduras se producen entre mayo y septiembre, particularmente en los días más calurosos.

En caso de picadura, si no vio al insecto, se puede deducir su naturaleza porque las abejas dejan el aguijón anclado en la piel mediante unos garfios laterales que posee, mientras que la avispa lo conserva y puede volver a picar otras veces.

